

Protocolo com o Hospital Veterinário de Porto

As patologias a despitar são:

- Taras Oculares;
- Tiroíde;
- Cardiomiopatia;
- Síndrome de Wöbblers.

Com o seguinte programa de idades:

A) Quando o exemplar realiza o despiste da displasia coxo-femural(HD) (após 12 meses):

- Cardiomiopatia;
- Taras Oculares;
- Tiroíde;
- Síndrome de Wöbblers;
- Displasia coxo-femural (HD).

Este pacote de custa - 200 €

B) Quando o exemplar tem cerca de 3 anos:

- Cardiomiopatia
- Taras Oculares
- Tiróide

Este pacote de custa 100 €

C) Quando o exemplar tem cerca de 6 anos:

- Cardiomiopatia;
- Taras Oculares;
- Tiroíde;
- Síndrome de Wöbblers;

Este pacote de custa 125 €

Depois dos 6 anos é recomendado um controlo anual cardíaco.

A necessidade para a repetição de algumas patologias é porque, como é sabido, todas elas poderão ser degenerativas, isto é, um cão jovem completamente livre no primeiro exame, poderá mostrar sinais no segundo ou terceiro exame.

De uma forma simples, abordamos agora o que é examinado em cada patologia:

- CARDIOMIOPATIA:

- **Electrocardiograma**, para verificar a ausência ou não de arritmias. Se necessário e para uma melhor análise de resultados, um aparelho HOLTTER está disponível no H.V.P.;

- **Ecocardiograma**, para diversas medições cardíacas;

- **Radiografia**, para verificação das dimensões exteriores do coração.

- **TARAS OCULARES:** são examinadas as seguintes doenças:

- **PHTVL / PHPV;**

- **Displasia da Retina;**

- **Atrofia Progressiva da Retina;**

- **Microftalmias;**

- **Membrana Pupilar Persistente**

Estas são as cinco doenças mais relacionadas com a nossa raça, mas também são examinadas as Cataratas e a Entropium.

- **TIRÓIDE:** é verificado o nível da hormona da tiróide(TSH), como também o nível da Tiroxina(T4). As amostras de sangue são enviadas pelo H.V.P. para a Universidade de Utrech, na Holanda, entidade com créditos firmados neste campo, sendo conhecidos os resultados cerca de duas semanas após o exame.

- **WÖBBLER:** aproveitando o facto do exemplar se encontrar anestesiado para o exame da displasia coxo-femural, é realizado o exame radiológico ao pescoço, para se verificar a posição das vértebras cervicais C6 e C7, as mais críticas nesta doenças na nossa raça. A radiografia é identificada tal qual para a radiografia do exame da displasia coxo-femural(HD).